




Státní
veterinární
správa

Ptačí chřipka


Preventivní opatření v drobnochovech

Jaro a podzim jsou období, kdy dochází k nárůstu volné zjiřících ptáků. Zvláště pak v období V tomto období existuje zvýšené riziko zavlečení ptačí chřipky do ovců a drůbeže.


Proč je nutné zajistit, aby byl průběžně sledován zdravotní stav drůbeže a včasná zvýšená pozornost dodržování preventivních opatření v chovech.




1. Drůbež v uzavřených objektech (krmítko a voda podáváte v uzavřeném prostředí).



2. Zabíráte přestupovou žijících ptáků, sledujte i jiných zvířat do dvora (plachty, síť).



3. Dodržujte osobní hygienu. Převlékání, přezouvání, mytí rukou při vstupu ze dvora do domu.



4. Sledujte zdraví drůbeže. Zvýšené hynutí, netečnost, průjem, otoky okolo očí a hřebínku, těžké dýchání mohou být příznaky chřipky.



5. Zvýšené úhyny drůbeže nahlašte Státní veterinární správě nebo svému veterinárnímu lékaři.



6. S podezřenou a úhynou drůbeží (ptáky) manipulujte opatrně a pouze s použitím ochranných prostředků (rukavice, gumové holínky).



Více informací
o ptačí chřipce
naleznete na
www.svscf.cz